ovipare vivipare

Les renards

Généralement, chaque femelle met au monde de 4 à 6 petits. Elle reste avec eux en permanence pendant les premières semaines et peut les déplacer en les attrapant par la nuque.

Les lapins

Un couple de lapins peut avoir jusqu'à 12 lapereaux par portée! À leur naissance, les lapereaux sont sourds, aveugles et sans poils.

Les chevaux et les poneys

Lorsqu'il sort du ventre de la jument, le poulain se hisse rapidement sur ses pattes pour téter. Il peut ingérer jusqu'à 15 litres de lait par jour!

Les poules

Une poule pond généralement un œuf par jour ou tous les deux jours. Pour qu'un œuf donne un poussin, il faut qu'elle s'accouple avec un coq. Elle couve l'œuf pendant 21 jours avant que le poussin ne sorte de sa coquille.

Les grenouilles

À la naissance, certains petits ne ressemblent pas du tout à leurs parents. C'est le cas de la grenouille. Le têtard qui sort de l'œuf et vit dans l'eau se transforme en plusieurs étapes en une belle grenouille qui peut se déplacer hors de l'eau en bondissant.

Les moutons

Le bélier est le mâle, la brebis la femelle et le petit s'appelle l'agneau. La brebis porte dans son ventre 1 ou 2 agneaux pendant 5 mois.

Les escargots

Après l'accouplement, les escargots enterrent leurs œufs dans la terre humide. Les petits escargots sortent des œufs 2 à 4 semaines plus tard.

Les écureuils

L'écureuil est un petit mammifère qui vit dans les arbres. Ses petites naissent aveugles et sans poils. Ils vont rester avec leur mère qui les allaite pendant 2 mois.

Les kangourous

Quand il nait, le petit kangourou pèse 1 gramme! Il reste 250 jours dans la poche de sa maman.

Les tortues

La tortue femelle utilise ses pattes pour creuser un trou dans lequel elle pond ses œufs, qui n'ont pas besoin d'être couvés. Leur éclosion peut durer plusieurs jours. Lorsqu'elles naissent, les petites tortues savent déjà marcher et se nourrir toutes seules.

Les cochons

Au bout de 3 mois, 3 semaines et 3 jours, les porcelets sortent du ventre de leur mère. La truie peut allaiter jusqu'à 14 porcelets à la fois!



Les éléphants

L'éléphanteau se développe dans le ventre de sa mère pendant presque 2 ans. L'éléphante va l'allaiter pendant 2 à 4 ans. Elle ne peut avoir un petit que tous les 4 ans minimum.

La roussette

Au moment de la ponte, la femelle s'enroule autour d'un support, souvent une gorgone, pour y attacher ses œufs.



L'abeille

Seule la reine a le pouvoir de pondre. Les œufs sont déposés dans la ruche au fond des alvéoles.

Les serpents

La coquille des œufs de serpents est molle.

Le geai

La femelle pond de 3 à 6 œufs de couleur verdâtre dans un nid. Les petits geais y restent 23 jours environ avant d'effectuer leur premier vol.

ACCÈS Éditions